

乳酸菌 및 酵母菌에 對한 化學物質의 放射線殺菌協力作用에 關한 研究

“D.H.A., Sorbic acid, 및 Menadion 의 協力作用에 對하여”

金鍾協·全世烈

(原子力研究所·生物學研究室)

Studies on synergistic actions of some chemicals on radiation sterilization of *Lactobacillus* and yeast.

“Synergistic actions of D.H.A., Sorbic acid and Menadion.”

Kim, Jong Hyup., and Chun. Sae Yul.

(Atomic Energy Research Institute, Div. of Biology.)

Abstract

The synergistic actions of certain antimetabolic agents for *Saccharomyces cerevisiae* and *Lactobacillus plantarum* on radiation sterilization have been studied.

The used chemical agents are sorbic acid, vitamin-K₃, dehydroacetic acid, p-oxybutyl benzoate and nitrofurazone, those are the permitted as food preservatives.

Experimental results are as following,

- 1) Survival fraction of yeast which was gamma-irradiated and influenced by sorbic acid or vitamin K₃ is much reduced than that of only irradiated respectively.
- 2) It seems like that the used chemicals acts synergistically on radiation sterilization. Sodium-dehydroacetate and p-oxybutyl benzoate are proved to be also synergistic but weakly.
- 3) Survival fraction of *Lact. plantarum* which was gamma-irradiated and influenced by sorbic acid, dehydroacetic acid or nitrofurazone respectively much reduced than that of only irradiated group, it can be estimated as synergistic action of chemical affected on radiation sterilization.
- 4) It was found that nutrient components can affect radiation sterilization of microorganisms protectively.

緒論

Gamma-ray 的 殺菌作用에 關해서는 이미 Hollaender(1955 年)氏에 依하여 널리 紹介되고 있으며, ① gamma-ray による 農水產製品, 醫藥品等의 殺菌을 依록하려는 研究가 各國에서 活潑히 進行되고 있다. (Brown, 1960, Lerke, 1960, Matsuyama, 1966, Meshitsuka, 1963)

大體로 食品에 對해서는 種類에 따라서 照射量의

限界가 0.25 M. rad 로부터 3.0 M. rad 까지 있으나, 實際로는 0.3 M. rad 程度에서 惡臭와 色變現象이 일어나므로 放射線의 食品工業에의 利用을相當한 隘路를 内包하고 있는 것이다. (Grosch, 1965)

따라서 可及的 低線量(0.5 M. rad 以下이며는 無難하다)으로서 殺菌効果를 最大限으로 얻을려는 努力이 研究面에 反映되고 있다. (Brown, 1960, Eldjarn, 1960, Koch, 1957, Wilson, 1960).

其中에서도 加熱處理를 通한 物理的方法은 Kempe,

1960 年, 氏等에 依하여 成功의이 있으으며, 化學的方法으로서는 増感劑, 殺菌協力劑의 檢索方向으로 研究가 進行되고 있다. (Matsuyama, 1960~1966, Meshitsuka 및 Oka, 1963~1966).

한편 우리나라에서는 李敏載(1965~1966)氏等에 依하여 增感劑의 檢索研究가 있다.

以上의 諸氏에 依하여 使用된 化學物質의 種類를 보면은 Antibiotics, Sodium chloride, Organic acids, Ferric compounds 等이 있으며, 食品工業에 適用이可能한 物質과 不適當한 物質이 있다.

本研究에 있어서는 許可된 食品保存劑인 Sorbic acid, Dehydroacetic acid, Para-oxybutylbenzoate, Vitamin K₃, 및 Nitrofurazon 을 使用하여 乳酸菌과 酵母菌에 對한 放射線殺菌協力作用을 突明코자 하였다.

Sorbic acid 와 Dehydroacetic acid 는 그 作用機作이 알리어져 있으나(York, 1964, Nomoto, 1954) 電離放射線인 gamma-ray 의 生物學的作用方式과 이들 化學物質이 어떤 聯關係를 갖이고 있는가를 突明함이 最終의 目標인 것이다.

本研究遂行에 있어서 指導하여 주신 李敏載教授(서울大學校), 李根培博士(原子力研究所)께 感謝를 드리며, 높은 助言을 하여준 松山晃, 岡充 兩博士께 深甚한 謝意를 表합니다.

實驗材料 및 方法

1. 菌株; *Lactobacillus plantarum* 및 *Saccharomyces cerevisiae* 를 使用하였으며, *Sacch. cerevisiae* 는 Diploid cell 이 있다.

2. 放射線源 및 線量率; Cobalt-60, gamma irradiator 를 使用하였으며, 線量率은 1 m 距離에서 1320 Curie/hr. 이고 이 線量은 1,000 Curie 的 線源에서 放出되었다.

3. 照射方法; 化學物質과 培養液(培地)의 混合液을 試驗管에 一定量式 넣고 微生物의 生理食鹽水懸濁液을 pipett로서 一定量式注入 한後 放射線線源에 密着시켜 該當線量을 照射하였다.

4. 生殘率의 算定; 照射을 完了한 試驗管에서 菌의 懸濁液을 pipett로서 一定量式取하여 T.G.Y. media 또는 Malt extract media의 agar plate에 培養하고 生育하는 Colony 를 Quebec's colony counter로서 算定하였다.

5. 藥劑의 投與法; D.H. A 와 vitamin K₃는 Sodium 鹽을 使用하였으며, Nitrofurazon 과 Sorbic acid는 각각 Table. 4, 5와 같이 使用하였다. 酵母菌에 對한 實驗에 있어서는 L.D.₅₀의 量을 事前

에豫備實驗을 通하여 Probit 法으로서 算出하였다. (Table. 4)

6. 培地의 組成; *Lactobacillus* 및 yeast에 對한 培地의 組成은 Table 1, 2, 3과 같다.

Table. 1. Constituents of (A) media for yeast.

Glucose	1.0%
Peptone	1.0%
Potassium phosphate	0.5%
Magnesium sulphate	0.1%
Malt extract	1.0%
(Agar agar	2.0%)
Distilled water	97 c.c.

Total 100 c.c.

p.H. 5.7

Table. 2. Constituents of (B) media for yeast.

Glucose	0.5%
Peptone	0.5%
Potassium phosphate	0.25%
Magnesium sulphate	0.1%
Malt extract	0.5%
Distilled water	98 c.c.

Total 100 c.c.

p.H. 5.8

Table. 3. Constituents of media for *Lactobacillus*.

	(C)	(D)
Tryptone	2.0%	1.0%
Glucose	2.0%	1.0%
Yeast extract	0.5%	0.25%
Sodium chloride	0.6%	0.3%
Tomato juice	0.1%	0.05%
(Agar	2.0%)	
Distilled water	95 c.c.	98 c.c.

Total 100 c.c.

p.H. 6.8

Table. 4. L.D.₅₀ of chemicals against yeasts.

Chemicals	L.D. 50 (g/100 c.c.)
Sorbic acid	0.0123
Vitamin K ₃	0.00074
Sodium dehydroacetic acid	0.0057
P-oxybutyl benzoate	0.0047

Table. 5. The added doses of chemicals against *Lactobacillus*.

Chemicals	Doses (g/100 c.c.)
Sorbic acid	0.005, 0.05, 0.5. each.
Nitrofurazone	0.00005, 0.0005, 0.005. each.
Sodium dehydroacetic acid	0.001, 0.01, 0.1. each.

放射線照射時의 試驗管內 培地濃度는 培養때보 담은稀釋하여 使用하였다. (Table. 2, 3) 이것은 培地成分의 保護的干涉을 節減시키기 위해서였다.

實驗結果 및 考察

酵母菌의 生殘率에 對한 放射線單獨照射區와 放射線과 化學藥劑의 併合處理區의 影響은 Fig. 1 과 같다. 即 放射線과 化學藥劑의 併合處理는 放射線單獨處理에 比하여 懸隔한 差異를 보여주고 있으며 前者의 境遇는 殺菌效果를 나타내고 있다.




Fig. 1. Synergistic action of sorbic acid for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization (1) (•); gamma irradiated, (△); sorbic acid (0.12 mg/c.c.) and gamma irradiated, (×); sorbic acid (0.152 mg/c.c.) and gamma irradiated.

Fig. 2는 放射線만을 照射한 Control區와 放射線과 sorbic acid를 併合處理한 区와의 比較이다. 同量의 sorbic acid 處理를 하였드라도 放射線量이增加함에 따라서 殺菌效果는增加한다. Fig. 1에서 보는 바와 같이 同線量에서는 sorbic acid의增加에 따라서 殺菌效果는增加한다. 따라서 sorbic acid는 放射線의 殺菌作用에 協力的으로 作用함을 알 수 있다.




Fig. 2. Synergistic action of sorbic acid for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization. (2) (•); sorbic acid alone, (○); sorbic acid and gamma irradiated of 10×10^4 r. (△); sorbic acid and gamma irradiated of 20×10^4 r. (×); sorbic acid and gamma irradiated of 30×10^4 r.

vitamin K₃ (Menadion)의 作用은 Fig. 3과 4에서 보는 바와 같다. 그 生殘率의 모양은 sorbic acid의 境遇와 同一하다.

sorbic acid와 K₃의 殺菌協力效果는 莫大하며 그 程度는 大略 같다. Dehydroacetic acid (D.H.A.)의 效果는 Fig. 5 및 6에서 보는 바와 같다.

P-oxybutylbenzoate (P.O.B.B.)의 效果는 Fig. 7 및 8에서 보는 바와 같다. D.H.A와 P.O.B.B.의 두 藥品에 있어서는 그 殺菌效果가 前者的 sorbic acid와 K₃에 未及하지 마는 殺菌協力效果가 있음을 알 수 있다.

G.K. York(1964)가 報告한바 있는 sorbic acid의 生育阻害作用이 微生物細胞의 oxidative phosphorylation 및 sulfhydryl enzyme의 抑制라고 한다며는, 放射線과 sorbic acid의 協力的 殺菌作用은 細胞의 生理代謝와 密接한 關係가 있을 것으로 料된다. 한편 放射線이 cystein과 같은 SH-化合物에 依하여 그 障害가 除去되는 事實은 Sorbic acid에 있어서도 同一하다. 이 러한 類同點은 放射線의 細胞生理




Fig. 3. Synergistic action of vitamin K₃ for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization. (1) (•); K₃(0.0074 mg/c.c.) and gamma irradiated. (△); " (0.0104 mg/c.c.) and gamma irradiated. (×); " (0.016 mg/c.c.) and " "




Fig. 4. Synergic action of vitamin K₃ for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization (2) (•); Vitamin K₃ only alone, (○); K₃ and gamma irradiated of 10×10^4 r. (△); K₃ and gamma irradiated of 20×10^4 r. (×); K₃ and gamma irradiated of 30×10^4 r.




Fig. 5. Synergistic action of sodium dehydroacetate for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization (1) (•); gamma irradiated alone, (○); gamma irradiated and 0.057 mg/c.c. of D.H.A treated.

(△); " and 0.075 mg/c.c. " (×); " and 0.098 mg/c.c. "




Fig. 6. Synergistic action of sodium dehydroacetate for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization.

(•); Sod. D.H.A. alone treated, (○); " and gamma irradiated (10×10^4 r.) (△); " and " (20×10^4 r.) (×); " and " (30×10^4 r.)




Fig. 7. Synergistic action of p-oxybutylbenzoate for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization. (1) (•); gamma irradiated alone, (△); P.O.B.B.(0.047 mg/c.c.) and gamma irradiated. (×); " (0.058 mg/c.c.) and "




Fig. 8. Synergistic action of p-oxybutylbenzoate for *Sacch. cerevisiae* on radiation sterilization. (2) (•); P.O.B.B. treated alone, (○); " and gamma irradiated(10×10^4 r.) (△); " and " (20×10^4 r.) (×); " and " (30×10^4 r.)

學的効果를 分析하는데 있어서 어떤 資料를 提供하는 것 같다.

한편 D.H.A의 生育阻害機作(Nomoto, 1954)은 好氣的狀態下에서 cyclophorase enzyme system를 阻害하고 嫌氣的狀態下에서는 Glycolysis 以外의 代謝系를 阻害한다고 하며, 그後에 알려진 바로는 D.H.A는 嫌氣的解糖과 磷酸代謝와의 共軛을 解除하고 有機磷酸化合物의 生成과 蓄積을 阻害하는 "Uncoupler"의 効割을 한다고 한다.

D.H.A와 放射線과의 殺菌協力作用은 Sorbic acid나 또는 vitamin K₃의 添加때 보답은 顯著하게 微弱하다. 따라서 Sorbic acid와 放射線과의 協力作用은 D.H.A보다 크며, 相互連關係이 깊은것으로思料된다.

vitamin K₃의 添加에 있어서도 그 効果는 sorbic acid와 同等하다(Fig. 3, 4 參照)

p-oxybutylbenzoate는 協力作用이 微弱하나마若干 있었다.(Fig. 7, 8). 그러나 生殘菌數가 많았음으로 殺菌效果를 거두었다기보다는 生育阻害作用으로 보는것이 妥當하다.




Fig. 9. Synergistic action of sorbic acid for *Lact. plantarum* on radiation sterilization. (1) (A); Control, only irradiated. (B); Sorbic acid(5 mg/100 c.c.) treated and irradiated. (C); Sorbic acid(50 mg/100 c.c.) treated and irradiated. (D); Sorbic acid(500 mg/100 c.c.) treated and irradiated.




Fig. 10. Synergistic action of sorbic acid for *Lact. plantarum* on radiation sterilization. (2)
 (A); Sorbic acid only, but without irradiation.
 (B); Sorbic acid irradiated. (40×10^4 r.)
 (C); Sorbic acid and irradiated. (80×10^4 r.)
 (D); Sorbic acid and " (120×10^4 r.)




Fig. 11. Synergistic action of Dehydroacetic acid for *Lact. plantarum* on radiation sterilization. (1)
 (A); Control, only irradiated.
 (B); D.H.A. (1 mg/100 c.c.) treated and irradiated.
 (C); " (10 mg/100 c.c.) "
 (D); " (100 mg/100 c.c.) "

乳酸菌에對한 藥品의 影響은 Fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14 와 같다.

Fig. 9, 10에서 보는 바와같이 sorbic acid의添

加量이 增加함에 따라서 菌의 生殘率은 急激히 低下하고 0.5%의 濃度에 있어서는 致死線量의 1/3인 40×10^4 rentgen 으로서 殺菌効果를 거두었다. Fig. 10 은 X-輻에 sorbic acid의 添加量을 참고서 Fraction survival을 보았다. 生殘率의 減少는 Fig. 9의 結果를 더욱 뒷 바침하였다.

Fig. 11에서 보는바와 같이 Dehydroacetic acid




Fig. 12. Synergistic action of Dehydroacetic acid for *Lact. plantarum* on radiation sterilization. (2)
 (A); D.H.A treated only. (Control)
 (B); D.H.A treated and irradiated (40×10^4 r.)
 (C); " (80×10^4 r.)
 (D); " (120×10^4 r.)

以下(D.H.A)의 影響을 分析하면은 100 c.c.當 1 mg에서 100 mg 까지는 거의 같은 程度로 生殘率이 보였으나, Fig. 12는 그와는 조금 달라서 C,D의 添加量(10 mg, 100 mg)에서相當한 生殘率의 低下를 볼수있다. 即 1 mg/100 c.c 의 D.H.A 添加는 別로 影響을 주지 않았으나, 10 mg 以上의 使用에서는相當한 生殘率의 減少가 푸렷하였다. 乳酸菌에對해서는 D.H.A 가 靜菌作用을 나타내지 못한다고 報告되어 있으나(Nomoto, 1954) 放射線과의 併用에서 殺菌作用을 나타낸은 細胞代謝에서 어떤 變化가 일어난 것으로 思料하며 興味있는 問題이다.

Fig. 13 및 14에서 보는 바와같이 0.5 mg/1,000 c.c. 以上에서 殺菌的 協力現象이 일어났으며, D.H.A의 경우와 비슷하였다.

以上的 實驗結果는 营養이 豐富한 T.G.Y. 培地에서 放射線을 照射한 만큼, 一般的인 生理食鹽水溶液內에 Buffer solution 内에 照射한 것




Fig. 13. Synergistic action of nitrofurazone for *Lact. plantarum* on radiation sterilization.
(1) (A); Control, irradiated only.
(B); Nitrofurazone (0.05 mg/1,000 c.c.) treated and irradiated.
(C); Nitrofurazone (0.5 mg/1,000 c.c.) treated and irradiated.
(D); Nitrofurazone (5 mg/1,000 c.c.) treated and irradiated.

과는 死滅率이 다르다. 即 Frazier(1960)가 記載한 食品微生物의 Killing doses 보다는 높다. 이點은 使用된 培地의 營養分 때문에 알았다 (Lee, Kim, 1967)

大體로 이와같은 化學藥品은 現行의 食品保存劑 (Food preservatives)들로서 人體에 無害한 것이다. 이들 藥品은 또한 選擇的으로 微生物의 metabolism 을 阻害하여 發育을 阻止하는 作用이 있음으로




Fig. 14. Synergistic action of nitrofurazone for *Lact. plantarum* on radiation sterilization.(2)
(A); Control, only irradiated.
(B); Nitrofurazone treated and irradiated(40×10^4 r.)
(C); " and " (80×10^4 r.)
(D); " and " (120×10^4 r.)

藥品의 Antimetabolic action 과 放射線의 阻害作用이 協力的으로 일어나는 것으로 思料된다.

따라서 이러한 殺菌協力作用은 食品 및 醫藥品等의 殺菌過程에 있어서 可及的 低線量을 適用할 수 있으며 高線量 使用으로 因하여 派生되는 副作用을 防止하는 方法이 될 수 있다.

앞으로 上記藥品들이 發揮하는 metabolic activity에 對한 特異한 阻害作用(Nomoto, 1954, York, 1964)과 放射線의 代謝阻害作用과의 關聯性을 代謝面에서 檢討할 必要가 있는 것으로 믿는다.

摘

要

Saccharomyces cerevisiae 및 *Lactobacillus plantarum*의 放射線感受性에 미치는 Sorbic acid, vitamin K₃, Dehydroacetic acid, P-oxybutyl benzoate, 및 Nitrofurazone의 致死協力現象을 研究하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

- 1) 酵母菌의 放射線感受性中 致死率은 Sorbic acid, Vitamin K₃, etc. 依하여 協力的으로 增加되었으며, Sodium-dehydroacetate 와 P.O.B.B. (P-oxybutyl benzoate) 는 若干 弱하나마 協力的致死作用을 나타내었다.
- 2) 乳酸菌의 放射線에 依한 致死率은 Sorbic acid, Sodium-dehydroacetic acid 및 nitrofurazone 等에 依하여 協力的으로 增加되었다.
- 3) 放射線 照射時의 微生物의 營養的環境은 致死線量을 크게支配하고 있다.

References

1. Brown, W.L., et al, 1960, The influences of low level gamma-irradiation antibiotic treatment,
- storage temperature and vacuum packing on flavour and bacterial changes in cured bacon; Food Technology, Vol. 14, no. 2.
2. Eldjarn, L., et al, 1960, Mechanisms of prot-

- ective and sensitizing action, Mechanisms in Radiobiology, Vol. 2. Academic Press, N.Y.
3. Koch, R., 1957, The problem and constitution of radiation-sensitizing agents, Proceedings of the fifth International Conference on Radiobiology, Stockholm, 1956.
4. Lerke, P.A., 1960, Effects of electron beam irradiation on the microbial content of spices and teas; Food Technology, Vol. 14, no. 6.
5. Matsuyama, A., 1966, Recent advances in food irradiation research in Japan; I.A.E.A./F.A.O. International Symposium on food irradiation, Karlsruhe, 1966.
6. Meshitsuka, G., et al, 1963, Synergistic action of alkali halides on radiation sterilization of yeasts; Synergistic action of NaCl. Tokyo Isotope Center, Annual Report, Vol. 2, 1963.
7. " 1963, Synergistic action of alkali halides on radiation sterilization of yeasts: Comparison of synergistic action of alkali halides. "ibid", Vol. 2.
8. Matsuyama, A., 1966, The present and future problems in food irradiation; Jour. of Japan Food Irradiation, Vol. 1, no. 1.
9. Nomoto, M., et al, 1954, Studies on the mechanism of antimicrobial action of dehydroacetic acid. Jour. of Agr. Chem. Soc. of Japan.
10. Yamazaki, K., and Oka, M., 1964, Synergistic action of salts of organic acids on radiation sterilization of yeast; Tokyo Isotope Research Center, Annual Report, Vol. 3.
11. Wilson, G.D., et al, 1960, The use of antibiotics and gamma irradiation in the aging of steaks at high temperatures; Food Technology, Vol. 14, 3.
12. York, G.K., et al, 1964, Mechanisms in the inhibition of microorganism by sorbic acid; Jour. of Bacteriology, Vol. 88, no. 2.
13. Lee, K.B. and Kim, J.H., 1967, Studies on Radio-preservation of Korean food., Ann. Report of Atomic Energy Reseach Inst. of Korea. Vol. 7, 1967.